

یسا ہے یہ جوان اور نچے دونوں حالتوں میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابتدائی حالت میں چونکہ یرتنے کے قریب پایا جاتا ہے اس لئے مندرجہ بالا چاروں پوائنٹس پر ان کے جوان اور نچے فی پودا نوٹ کئے جائیں گے۔ ستمبر، اکتوبر میں حملہ کی صورت میں ان پوائنٹس پر نیٹ کی مدد سے تیلہ کی تعداد فی نیٹ معلوم کریں۔

### دھان کے سنڈیوں کے معائنہ کا طریقہ

تین شہ مقامات پر پودوں اور شاخوں کی کل تعداد معلوم کی جائے گی ان میں حملہ شدہ شاخوں کی تعداد معلوم کر کے حملہ فی صد لکھ دیا جائے گا۔

### دھان کے تیلوں کے معائنہ کا طریقہ

تیلہ کا حملہ عموماً لاب لگانے کے ۲۵ دن سے ۳۵ دن کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ موسمی حالات کے مد نظر اور ستمبر کے وسط میں اس کا حملہ شدت اختیار کر

## دھان کا پیرے شیڈول اور لاگت / خرچہ روپے فی ایکڑ

| شمار | نام فرسٹ کلاس عوائل | نام کرم کش مرکب                 | مقدار فی ایکڑ | نرخ (فی کلو گرام)  | خرچہ فی ایکڑ | وقت اور طریقہ استعمال             |
|------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| ۱-   | تیلہ کی سڈیاں       | (ان زری پڑیہ پھوٹا)             | ۱۱/۳          | ۱۸/۵ = روپے فی کلو | ۲۴/۵         | ایک ہفتہ کی زری پر دھوٹا کریں۔    |
|      | ڈا نندو سڈی         | بی۔ ایچ سی ۱۰٪ + ڈی۔ ڈی۔ ٹی ۱۰٪ | ۳۱/۳          | ۱۲/۱۰              | ۲۲/۵         |                                   |
|      | (ان سینیڈو سڈی      | بڈریہ واز دار زری               | ۷             | ۲۸/۵۰              | ۱۹۹۶۵۰       | کسی ایک دانہ دار                  |
|      | (ان گلابی سڈی       | باسوین ۱۰٪                      | ۷             | ۲۸/۵۰              | ۱۹۹۶۵۰       | زہر کو ۱۵ دن کی زری پر چھٹہ کریں۔ |
|      |                     | ڈایا زینان ۱۰٪                  | ۱۰            | ۲۵/۵۰              | ۲۵۵/۵        |                                   |
|      | فیورڈان ۳٪          | سیویڈال ۲٪                      | ۱۰            | ۳۲/۵۰              | ۳۲۵/۵        |                                   |
|      | یاڈان ۴٪            | لار سین ۵٪                      | ۱۰            | ۲۴/۵۰              | ۲۴۵/۵        |                                   |
|      |                     |                                 | ۹             | ۲۳/۵۰              | ۲۰۷/۵        |                                   |

| نمبر شمار | نام زرستان و اہل     | نام کم کش مرکبات  | مقدار فی ایکڑ | نرخ (فی کلو لٹر)  | خرچہ فی ایکڑ | وقت اوپر لکھے استعمال   |
|-----------|----------------------|---|---------------|-------------------|--------------|---|
|           | نورسٹی               | (ب) فصل<br>بذریعہ روانہ وار زرستان<br>(ا) پہلی اور دوسری زرستان | ۹ کلو گرام    | ۲۸/۵۰ روپے فی کلو | ۲۵۶/۰ روپے   | دی گئی ذہنوں میں سے<br>ایک زرستان کو لایا کی مشقی                               |
|           | سفید سٹی             | یاسوین ۱۰٪<br>ٹوایا زینان ۱۰٪<br>فیورٹان ۳٪                     | ۹             | ۲۸/۵۰             | ۲۵۶/۰        | کے ۲۵-۳۰ دن بعد<br>پہلی دفعہ اور پھر ۵۵-۵۵                                      |
|           | گلابی سٹی            | سیوڈال ۸٪<br>یاڈان ۳٪   | ۱۰            | ۲۲/۵۰             | ۲۲۵/۰        | دن بعد دوسری دفعہ کھڑے<br>پانی میں یکساں چھڑے دیں۔                              |
|           | لاربین ۵٪            |   | ۹             | ۲۳/۰              | ۲۰۷/۰        |   |
| ۲-        | سفید پستی تیلہ       | بی۔ ایچ سی ۱۰٪<br>سیون ڈسٹ                                      | ۳ کلو گرام    | ۱۸/۰ روپے فی کلو  | ۵۴/۰ روپے    | کیڑے کے نمودار ہونے<br>پر کسی ایک زرستان کا دھوڑا کریں۔                         |
| ۳         | پتہ لپیٹ سٹی         | میسن ۵۰٪ ای سی<br>سیلا تھیان ۵۰٪ ای سی                          | ۱۰۰۰ ملی لٹر  | ۱۴۴/۰ فی لٹر      | ۱۴۴/۰ روپے   | کیڑے کے نمودار ہونے<br>پر کسی ایک زرستان کے ساتھ<br>فصل کو پیرے کریں۔           |
| ۴         | سپا<br>(سیاہ جھونڈی) | سومیتھیان ۵۰٪ ای سی<br>ٹوکاس ۱۰۰٪ ای سی                         | ۵۰۰ ملی لٹر   | ۱۶۵/۰ فی لٹر      | ۸۲/۰ روپے    |   |
| ۵-        | ٹوکا                 | بی ایچ سی ۱۰٪ ڈسٹ<br>ٹی۔ ڈی۔ ٹی ۱۰٪ ڈسٹ                         | ۱/۴ کلو گرام  | ۱۸/۰ روپے فی کلو  | ۲۴/۰ روپے    | کیڑے کے نمودار ہونے<br>پر دھوڑا کریں۔   |
| ۶-        | بلا سٹ               | ریسیا سٹ<br>بنیلیٹ<br>کاسومین                                   | ۲۵۰ گرام      | ۲۰۰/۰ روپے فی کلو | ۵۰/۰ روپے    | بیماری کی علامات ظاہر<br>ہونے پر کسی ایک زرستان<br>کے ساتھ فصل کو پیرے<br>کریں۔ |
| ۷-        | پتوں کا جھوڑا        | ڈالی تھین۔ ایم ۴۵<br>انٹرکول۔ ڈی بی پی                          | ۱۰۰۰ گرام     | ۹۵/۰ روپے فی کلو  | ۹۵/۰ روپے    | بیماری کی علامات ظاہر<br>ہونے پر کسی ایک زرستان کے<br>ساتھ فصل کو پیرے کریں۔    |

| شمار | نام زر رساں عوامل | نام کم کش مرکبات                   | مقدار فی ایکڑ                       | زرع (فی کلو لٹر)             | خرچہ فی ایکڑ         | وقت اور طریقہ استعمال  |
|------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| ۱-   | بند کانگاری       | وائٹا ویکس<br>بنیلیٹ               | ۸ گرام فی ہم کلوگرام بیج<br>" " " " | ۳۲۰ روپے فی کلو<br>" " " ۵۵۰ | ۲/۵۶ روپے<br>" " ۶/۰ | کاشت سے پہلے بیج<br>کو زہر گائش دی گئی<br>زہر وہ میں ایک زہر کا<br>استعمال کریں۔                   |
| ۹-   | جرطی بوٹیاں       | میچٹھی ۶۰٪ ای سی<br>سیرن ۱۰ بوزنڈر | ۸۰۰ ملی لٹر<br>کلوگرام              | ۱۶۵ روپے فی لٹر<br>" " ۲۲۰   | ۱۳۲ روپے<br>" " ۲۲۰  | لاہ کی منتقلی کے ۳-۵<br>دن بعد۔ مطلوبہ زر کو<br>۱۵ کلوگرام ریت میں ملا کر<br>کھڑے پانی میں چھڑکیں۔ |

دھان کی زرسری اور فصل کے نقصان رساں کیڑوں وغیرہ کے خلاف مختلف زہروں  
اور ان کی لاگت فی ایکڑ دی گئی ہے۔ زرعی ادویات کی قیمتیں حتمی نہیں ہیں کیونکہ ان کی  
قیمتیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں تاہم موجودہ ریٹ کے مطابق لاگت فی ایکڑ  
تعیین کی گئی ہے۔

جونے ۱۹۸۸ء